



## *Caracterización del rol de enfermería en la consejería para prueba de VIH en un Hospital*

### *Characterization of the nursing role in HIV testing counseling in a Hospital*

### *Caracterização da atuação da enfermagem no aconselhamento sobre testagem anti-HIV em um Hospital*

Betsy Alexandra Sánchez-Palacios <sup>I</sup>

[bsanchez6@utmachala.edu.ec](mailto:bsanchez6@utmachala.edu.ec)

<https://orcid.org/0009-0006-0979-8639>

Verónica Yadira Segura-Solis <sup>II</sup>

[vsegural@utmachala.edu.ec](mailto:vsegural@utmachala.edu.ec)

<https://orcid.org/0009-0005-8224-7641>

Sara Margarita Saraguro-Salinas <sup>III</sup>

[ssaraguro@utmachala.edu.ec](mailto:ssaraguro@utmachala.edu.ec)

<https://orcid.org/0000-0002-4711-1416>

**Correspondencia:** [bsanchez6@utmachala.edu.ec](mailto:bsanchez6@utmachala.edu.ec)

Ciencias de la salud  
Artículo de Investigación

\* **Recibido:** 01 de febrero de 2024 \* **Aceptado:** 27 de marzo de 2024 \* **Publicado:** 15 de abril de 2024

- I. Estudiante, Carrera de Enfermería, Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud, Universidad Técnica de Machala, Machala, El Oro, Ecuador.
- II. Estudiante, Carrera de Enfermería, Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud, Universidad Técnica de Machala, Machala, El Oro, Ecuador.
- III. Licenciada en Enfermería, Facultad de Ciencias Químicas de la Salud, Universidad Técnica de Machala, Machala, El Oro, Ecuador.

## Resumen

**Introducción:** El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) es un retrovirus que ataca el sistema inmunológico humano, debilitándolo y dejando al cuerpo vulnerable a diversas infecciones y enfermedades, transmitiéndose principalmente a través del contacto directo con ciertos fluidos corporales, como sangre, semen, secreciones vaginales, entre otros, aunque el VIH no tiene cura, los avances médicos han llevado al desarrollo de terapias antirretrovirales (TAR) mismas que han demostrado ser efectivas que ayudan a controlar la replicación viral y mantener a las personas en un estado de salud relativamente estable. El rol de enfermería en la atención y cuidado de las pacientes con VIH es crucial, estos cuidados deben de ser específicos y adecuados al estado de salud del paciente por su mayor cercanía, además juega un papel fundamental ya que se debe brindar atención integral y estar sumergida en la prevención y educación para reducir y detectar problemas de salud a tiempo, enfermería en la consejería para la prueba del VIH en el entorno hospitalario, desempeña un papel clave en la promoción de la salud, la reducción del estigma asociado al VIH, y contribuyendo a la construcción de comunidades más saludables. **Objetivo:** Caracterizar el rol de Enfermería en la consejería para prueba de VIH en un hospital. **Metodología:** La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo por ello el tipo de investigación es descriptiva de corte transversal y de carácter analítico descriptivo. **Resultados:** Se obtuvo mediante encuestas que el 68% de la población estudiada recibe consejería mientras que el 32% de la misma no lo recibe.

**Palabras Clave:** Rol; Enfermería; VIH; Consejería; Caracterización.

## Abstract

**Introduction:** The Human Immunodeficiency Virus (HIV) is a retrovirus that attacks the human immune system, weakening it and leaving the body vulnerable to various infections and diseases, transmitted mainly through direct contact with certain body fluids, such as blood, semen, vaginal secretions, among others, although HIV has no cure, medical advances have led to the development of antiretroviral therapies (ART) that have proven to be effective in helping to control viral replication and keep people in a relatively healthy state. stable. The role of nursing in the care and attention of patients with HIV is crucial. This care must be specific and appropriate to the patient's health status due to its greater proximity. It also plays a fundamental role since comprehensive care

must be provided and be immersed in prevention and education to reduce and detect health problems in time, nursing in HIV testing counseling in the hospital environment, plays a key role in promoting health, reducing the stigma associated with HIV, and contributing to the construction of healthier communities. Objective: Characterize the role of Nursing in HIV testing counseling in a hospital. Methodology: This research has a quantitative and qualitative approach, therefore the type of research is descriptive, cross-sectional and of a descriptive analytical nature. Results: It was obtained through surveys that 68% of the studied population receives counseling while 32% of them do not receive it.

**Keywords:** Role; Nursing; HIV; Counseling; Characterization.

## Resumo

Introdução: O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é um retrovírus que ataca o sistema imunológico humano, enfraquecendo-o e deixando o organismo vulnerável a diversas infecções e doenças, transmitido principalmente pelo contato direto com determinados fluidos corporais, como sangue, sêmen, secreções vaginais, entre outros, embora o VIH não tenha cura, os avanços médicos levaram ao desenvolvimento de terapias anti-retrovirais (TAR) que provaram ser eficazes para ajudar a controlar a replicação viral e manter as pessoas num estado relativamente saudável. O papel da enfermagem no cuidado e atenção ao paciente com HIV é fundamental. Este cuidado deve ser específico e adequado ao estado de saúde do paciente devido à sua maior proximidade. Também desempenha um papel fundamental, pois o cuidado integral deve ser prestado e imerso. prevenção e educação para reduzir e detectar atempadamente os problemas de saúde, a enfermagem no aconselhamento sobre testagem do VIH em ambiente hospitalar, desempenha um papel fundamental na promoção da saúde, na redução do estigma associado ao VIH e na contribuição para a construção de comunidades mais saudáveis. Objetivo: Caracterizar a atuação da Enfermagem no aconselhamento sobre testagem anti-HIV em um hospital. Metodologia: Esta pesquisa possui abordagem quantitativa e qualitativa, portanto o tipo de pesquisa é descritiva, transversal e de natureza analítica descritiva. Resultados: Obteve-se através de pesquisas que 68% da população estudada recebe aconselhamento enquanto 32% deles não o recebem.

**Palavras-chave:** Papel; Enfermagem; HIV; Aconselhamento; Caracterização.

## Introducción

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es una infección que se transmite principalmente a través de la actividad sexual en la que se produce un desgaste del sistema inmunológico; y puede llegar a la etapa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) esta etapa se caracteriza por la presencia de infecciones oportunistas y neoplasias que provocan una morbilidad importante y una reducción de la calidad de vida. (Cornejo, 2021).

En 1981 se diagnosticó el primer caso de VIH, el mismo se logró identificar que pertenece a la familia de retrovertida, contrayéndose mediante relaciones sexuales; en la cual se expandió hasta convertirse en pandemia, resultado de ello se obtuvo 37 millones de personas infectadas. (Ortés, 2020).

De manera que, al tener varias parejas sexuales y no usar métodos de protección como los preservativos implica ser susceptible a contraer una infección de transmisión sexual, así mismo el síndrome de inmunodeficiencia adquirida se considera un problema de salud pública debido a la magnitud de la carga reflejada en la morbilidad y mortalidad de la población. (Carballo, 2020).

Según la Organización Mundial de la Salud OMS, la infección por el VIH es una etapa tardía si se encuentra en la fase 3 o 4 o si el recuento de la célula CD4 son menor a 200 mm<sup>3</sup>; de acuerdo a estudios estadísticos se obtuvo un aproximado de la población con VIH a nivel mundial, que corresponde a 36.9 millones de personas. (OMS, 2023).

En el Ecuador en el año 2019 existieron 4.320 casos de personas que viven con VIH, en la provincia de El Oro los datos estadísticos señalan que 257 personas tienen el virus lo cual corresponde a un 5.97% de la población nacional de ellos 70 son del sexo femenino y 187 de sexo masculino. (MSP, 2019).

Por consiguiente, fomentar a las pacientes a realizarse las pruebas contra VIH es trabajo crucial de enfermería debido a que se debe incentivar a llevar controles acerca de la salud, y explicar claramente en qué consiste ya que para muchas personas suele ser un tema que genera miedo e incertidumbre. (Guedes, 2021).

Siendo así, el rol de enfermería en la atención y cuidado de las pacientes con VIH es crucial, estos cuidados deben de ser específicos y adecuados al estado de la salud del paciente por su cercanía, además juega un papel fundamental ya que se debe brindar atención integral y estar sumergida en la prevención, y educación para reducir y detectar problemas de salud a tiempo. (Ventura, 2021).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la consejería del VIH/SIDA como “dos propósitos generales de prevenir la infección y transmisión del VIH y brindar apoyo psicosocial a aquellos usuarios directa o indirectamente afectados”. Se define como “una relación de seguridad y diálogo basada en la confianza mutua. (Velásquez, 2020).

Además, a todos los pacientes se les brinda consejería antes y después del diagnóstico de VIH, antes de comenzar el TAR y durante toda su vida ya que existen diversas iniciativas y propuestas de asesoramiento, con diferentes enfoques y metodologías. (Oblitas, 2020).

En el contexto actual de la atención de salud, la prevención y el control de enfermedades infecciosas, como el VIH, ocupan un lugar central en la labor de los profesionales de la salud. La Enfermería es fundamental en la implementación de estrategias de prevención y detección temprana, contribuyendo a la promoción de la salud y el bienestar de la comunidad. En este sentido, la consejería para la prueba de VIH se presenta como una herramienta crucial en la identificación y gestión de la infección. (Parra, 2018).

El papel de enfermería va más allá de la simple administración de pruebas, ya que implica la prestación de apoyo emocional, educación, y la facilitación de decisiones informadas por parte de los individuos. En este marco, la Enfermería asume un rol esencial en la consejería para la prueba de VIH en el entorno hospitalario, desempeñando un papel clave en la promoción de la salud, la reducción del estigma asociado al VIH, y contribuyendo a la construcción de comunidades más saludables. (Castillo, 2022).

El objetivo de la presente investigación consiste en caracterizar el rol de enfermería en la consejería para prueba de VIH en un hospital.

## **Metodología**

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo por ello el tipo de investigación es descriptiva de corte transversal y de carácter analítico descriptivo, se realizó la aplicación de una encuesta mediante la cual se recopiló información por parte de los usuarios que acuden al hospital.

En lo que consiste al análisis teórico se realizó una revisión bibliográfica de artículos científicos de alto impacto y fuentes confiables incluyendo la OMS Y MSP.

El área de estudio engloba a todos los usuarios que asisten al hospital básico de Piñas. El instrumento de aplicación empleado fue la encuesta, que incluye el consentimiento informado, este

instrumento consta con un total de 15 preguntas, las mismas que ayudarán a recabar información acerca del Rol de Enfermería en la Consejería para la realización de la prueba de VIH.

La población del estudio corresponde a los usuarios que asisten al hospital y la muestra corresponde a 100 usuarios.

**Criterios de inclusión:** Adultos hombres y mujeres que asisten al hospital de Piñas.

**Criterios de exclusión:** Usuarios que no asisten al hospital, usuarios que no desean realizar la encuesta, niños, jóvenes y adultos mayores.

Para la interpretación y el análisis de datos estadísticos se utilizó en el programa Statistical Package for the Social Science (IBM-SPSS).

## Resultados

*Tabla 1: Relación de edad con sexo*

		Sexo			
			Masculino	Femenino	Total
<b>EDAD ENCUESTADO</b>	DEL 18	Recuento	1	9	10
		% del total	1,0%	9,0%	10,0%
	20	Recuento	1	7	8
		% del total	1,0%	7,0%	8,0%
	23	Recuento	3	4	7
		% del total	3,0%	4,0%	7,0%
	24	Recuento	5	2	7
		% del total	5,0%	2,0%	7,0%
	25	Recuento	1	2	3
		% del total	1,0%	2,0%	3,0%
	27	Recuento	14	8	22
		% del total	14,0%	8,0%	22,0%
	29	Recuento	8	2	10
		% del total	8,0%	2,0%	10,0%



30	Recuento	7	5	12
	% del total	7,0%	5,0%	12,0%
35	Recuento	1	4	5
	% del total	1,0%	4,0%	5,0%
37	Recuento	1	7	8
	% del total	1,0%	7,0%	8,0%
40	Recuento	0	4	4
	% del total	0,0%	4,0%	4,0%
45	Recuento	0	4	4
	% del total	0,0%	4,0%	4,0%
Total	Recuento	42	58	100
	% del total	42,0%	58,0%	100,0%

*Autoría: Elaboración propia*

Se realiza de 100 personas encuestadas de las cuales el 58% son de sexo femenino, mientras que el 42% de sexo masculino, por otra parte, la edad que predomina es de 27 años con el 22% seguido del 12% que pertenece a 30 años y el 10% a 18 años, las edades de las personas que acuden al hospital son de manera variada por lo tanto se presenta diversidad de porcentajes.

**Tabla 2:** Recibió Consejería con material educativo VIH

		ENTREGARON MATERIAL EDUCATIVO SOBRE VIH			
		SI	NO	Total	
<b>RECIBIÓ CONSEJERIA DE VIH</b>	SI	Recuento	67	0	67
		% del total	67,0%	0,0%	67,0%
	NO	Recuento	1	32	33
		% del total	1,0%	32,0%	33,0%
<b>Total</b>		Recuento	68	32	100
		% del total	68,0%	32,0%	100,0%

*Autoría: Elaboración propia*

En la siguiente tabla se determina que el 67% recibe consejería de VIH y a su vez recibe material educativo para comprender el tema de mejor manera por otra parte el 33% no lo recibe esto implica que exista carencia de conocimientos.

**Tabla 3:** *Relación de información de la transmisión con prueba de VIH*

		SE REALIZÓ LA PRUEBA DE VIH			Total
		SI	NO		
<b>RECIBIÓ INFORMACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL VIH</b>	SI	Recuento	68	0	68
		% del total	68,0%	0,0%	68,0%
	NO	Recuento	0	32	32
		% del total	0,0%	32,0%	32,0%
Total		Recuento	68	32	100
		% del total	68,0%	32,0%	100,0%

*Autoría: Elaboración propia*

Según el siguiente análisis de resultados el 68% si recibió información acerca de la transmisión del VIH y ha procedido a realizarse la prueba con total seguridad mientras que el 32% restante no, esto posiblemente indica que aún existen miedos e incertidumbres y un probable estigma social ante el VIH.

**Tabla 4:** *Relación de información de las características con riesgos del VIH*

		RIESGOS DEL VIH			Total
		SI	NO		
<b>RECIBIÓ INFORMACIÓN DE LA</b>	SI	Recuento	68	0	68
		% del total	68,0%	0,0%	68,0%
	NO	Recuento	0	32	32
		% del total	0,0%	32,0%	32,0%



<b>CARACTERISTICAS DE LA PRUEBA DEL VIH</b>				
Total	Recuento	68	32	100
	% del total	68,0%	32,0%	100,0%

*Autoría: Elaboración propia*

De los resultados obtenidos hemos observado que el 68% si recibió información acerca de las Características y los Riesgos del VIH, mientras que el 32% no, esto nos indica que el personal de salud ha brindado charlas educativas acerca de esta patología.

**Tabla 5:** *Le explicaron la importancia de realizarse la prueba del VIH*

	Frecuencia	Porcentaje
SI	68	68,0
NO	32	32,0
Total	100	100,0

*Autoría: Elaboración propia*

Hemos obtenido que el 68% de los encuestados si les han explicado la importancia de realizarse la prueba del VIH y el 32% no, esto indica que la mayoría de los usuarios con la información que se le brindo sabe la importancia y así tiene conocimientos básicos del VIH.

## **Discusión**

En el contexto de la consejería para la prueba de VIH, los profesionales de enfermería desempeñan un papel crucial en la educación y prevención, proporcionando información e incluyendo las vías de transmisión, los métodos preventivos y la importancia del diagnóstico temprano. Al momento de realizar la prueba, enfermería debe seguir las pautas y protocolos establecidos de cada unidad de salud. (Espinoza, 2021)

Según (Fragueiro, 2021) la mayoría de las personas encuestadas fueron de sexo femenino al igual que en el presente estudio ya que sobresalen las mujeres con el 58% mientras que en otro estudio realizado por (Bertot, 2021) el sexo que más sobresale es el masculino además indica que los casos de VIH han aumentado considerablemente independientemente del sexo.

La Edad de los encuestados con mayor porcentaje fue 27 años y en un artículo publicado por (Bastán, 2020) nos indica que el grupo de edad con mayor frecuencia se dio en personas con menos de 30 años, sin embargo, (Camejo, 2021) en su artículo explica que la mayor incidencia se presenta en el rango de 25-34 años de edad de los encuestados que se tomaron en consideración para su estudio.

Según (Cornejo, 2021) existe un déficit de conocimientos acerca del VIH teniendo más del 60% de los usuarios esta carencia, así mismo señala que en muchas ocasiones se debe a falta de recursos para poder acceder a la comunicación sin embargo en nuestra investigación se ha determinado que el 67% de los encuestados ha recibido consejería sobre el VIH por lo tanto tienen conocimiento oportuno acerca del virus.

En el caso del personal de enfermería es importante entregar material educativo adecuado para su comprensión de los usuarios acerca de un tema específico, en el hospital de Piñas se identificó que la mayoría de las personas encuestadas recibe material educativo acerca de VIH, en un estudio realizado por (Jesús, 2020) nos indica que para entregar material educativo a pacientes con VIH es esencial utilizar métodos de lenguaje y que estos no sean técnicos para que el mensaje pueda llegar al receptor.

Según (Marín, 2020) el modo más común de transmisión del VIH incluye el contacto sexual sin protección con una persona infectada, el uso compartido de agujas contaminadas, y la transmisión vertical. También es posible transmitir el virus a través de transfusiones de sangre o trasplantes de órganos si no se realiza un adecuado control de la sangre y tejidos donados, de allí la importancia de diagnosticar a tiempo, ya que así se podrá tratar de evitar el contagio vertical y evitar propagar esta infección.

En nuestra investigación realizada el 68% recibió información sobre la transmisión del VIH, sin embargo, el 32% desconoce la misma; según (Jaramillo, 2021) en su artículo describe que el 73% no recibe información sobre la infección del VIH, mientras (Marín, 2020) nos manifiesta que el 90% conoce de las transmisiones del VIH.

Según (Miró, 2021) es recomendable realizarse la prueba del VIH cada tres meses si mantiene relaciones sexuales con varias parejas, para prevenir y detectar a tiempo esta infección, y así poder iniciar un tratamiento que protegerá el sistema inmunológico y mejorar la calidad de vida.

En base a la encuesta de nuestra investigación el 68% se ha realizado la prueba VIH, mientras que el 32% no, según (Francisco, 2019) en su artículo publicado el 66,2% se realizó la prueba y el

83,3% no se realizó la prueba del VIH, mientras el artículo (Melo, 2022) nos dice que el 56,07% nunca se ha realizado la prueba del VIH.

Por eso (García, 2021) indica que la prevención más eficaz para evitar contraer el VIH consiste en la utilización de medidas de barrera al tener relaciones sexuales como el uso de preservativos, la educación y la concientización es fundamental para tomar decisiones acertadas, limitar el número de parejas sexuales, evitar compartir jeringuillas contaminadas y en el caso de mujeres embarazadas recibir atención prenatal especializada, terapia antirretroviral y seguir protocolos específicos para prevenir la transmisión vertical al feto.

En cambio (Gómez, 2019) las características principales de la prueba de VIH comprenden el tiempo de espera para obtener resultados el cual es mínimo ya que se basa en una prueba rápida en el cual se utiliza reactivos y una pequeña muestra de sangre, el resultado se lo podrá visualizar e interpretarlo de manera inmediata, el 68% de usuarios encuestados conoce estas características mientras que el 32% restante no.

Tal como indica (Bossonario, 2022) el riesgo de infectarse con VIH es tener relaciones anal o vaginal sin condón, otras infecciones de transmisión sexual (ITS), como sífilis, herpes, clamidia, gonorrea o vaginosis bacteriana; el uso nocivo de bebidas alcohólicas o drogas durante las relaciones sexuales, compartir agujas, jeringas u otros materiales contaminados, como transfusiones de sangre o trasplantes de tejidos sin respaldo de protección o procedimientos médicos que impliquen cortes o punciones con instrumentos no esterilizados, las lesiones accidentales por pinchazos con agujas son frecuentemente comunes entre los trabajadores de la salud.

De acuerdo con nuestra investigación el 68% de los usuarios conocen los riesgos que puede presentar el VIH y el 32% no lo reconoce, por lo tanto (López, 2023) nos indica que el 79,1% tiene conocimiento sobre los riesgos del virus y el 7,1% no conocen los riesgos de esta infección.

Finalmente (Espinosa, 2022) el propósito de realizar la prueba de VIH radica en prevenir la transmisión y la propagación del virus, en un estudio realizado por (Mazo, 2019) determina que en su minoría el 1.7% de encuestados no se realiza la prueba por motivo de que no saben cuáles son los beneficios por otra parte en el hospital de Piñas el 68% si conoce la importancia de realizarse la prueba, de esta manera se protege la salud y de los demás.

Gracias a la consejería se usan estrategias adecuadas para la intervención de la salud por personal capacitado para desarrollar relaciones profesionales que ayuden a los pacientes en un ambiente

confiado, identificando su estado de salud y los factores de riesgo que enfrentan, permitiendo gestionar su salud, permitiéndoles desarrollar habilidades críticas de resolución de problemas para tomar decisiones. (Alviso, 2023).

## Referencias

1. Alviso, A. D. (2023). Conocimiento de los profesionales de salud sobre la Ley 3.940 que establece derechos, obligaciones y medidas preventivas de las personas afectadas por el VIH/SIDA. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*. doi:[https://doi.org/10.37811/cl\\_rcm.v7i3.6677](https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i3.6677)
2. Bastán, J. E. (2020). Adherencia al tratamiento antirretroviral de personas con VIH/sida en la Atención Primaria de Salud. *Revista Habanera de Ciencias Médicas*. doi:<http://orcid.org/0000-0002-3639-2814>
3. Bertot, Y. C. (2021). Caracterización clínico-epidemiológica de pacientes con VIH/sida en el municipio Manuel Tames, Guantánamo. *Revista Información Científica*. doi:<http://orcid.org/0000-0002-5216-6139>
4. Bossonario, P. A. (2022). Factores de riesgo de infección por VIH entre adolescentes y jóvenes: revisión sistemática. *Revista Latino Americana de Enfermagem*. doi:[10.1590/1518-8345.6264.3695](https://doi.org/10.1590/1518-8345.6264.3695)
5. Camejo, C. S. (2021). Caracterización de la infección por VIH/sida en el municipio Guantánamo. *Revista Información Científica*. doi:<http://orcid.org/0000-0001-9228-4351>
6. Carballo, K. B. (2020). Coinfección por VIH y COVID 19: Reporte de Serie de Casos. *Revista Científica de la Escuela Universitaria de las Ciencias de la Salud*. doi:<https://doi.org/10.5377/rceucs.v7i2.12619>
7. Castillo, G. D. (2022). Eficiencia del cribado de VIH en urgencias: revisión sistemática y metanálisis. *Revista científica de la sociedad española de medicina de urgencias y emergencias*. Obtenido de <https://revistaemergencias.org/numeros-anteriores/volumen-34/numero-3/eficiencia-del-cribado-de-vih-en-urgencias-revision-sistemica-y-metanalisis/>

8. Cornejo, N. A. (2021). Asociación entre nivel educativo y conocimiento sobre transmisión de VIH/Sida en mujeres adolescentes de Perú-ENDES 2019. *Revista de la Facultad de Medicina Humana*. doi:<http://dx.doi.org/10.25176/rfmh.v21i4.4266>
9. Espinosa, M. (2022). Pruebas confirmatorias y aplicación de algoritmos. *Revista Mexicana de Medicina Transfusional*. Obtenido de <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=107023>
10. Espinoza, R. W. (2021). Factores asociados a la no adherencia al tratamiento antirretroviral en personas con VIH/SIDA. *Horizonte Médico (Lima)*. doi:<http://dx.doi.org/10.24265/horizmed.2021.v21n4.09>
11. Fragueiro, C. L. (2021). Repercusiones del estigma en la calidad de vida de los adultos con VIH/SIDA: Una revisión sistemática. *MLS Psychology Research*. doi:<https://doi.org/10.33000/mlspr.v4i1.606>
12. Francisco, M. T. (2019). La realización del test diagnóstico para el VIH entre los participantes del carnaval. *Enfermería Global*. doi:<https://doi.org/10.6018/eglobal.18.1.306001>.
13. García, C. G. (2021). Prevención del VIH: análisis de conductas sexuales de riesgo y propuestas de intervención. *Revista Infad de psicología*. Obtenido de <https://revista.infad.eu/index.php/IJODAEP/article/view/2030>
14. Gómez, M. A. (2019). Evaluación de un programa de salud pública sobre diagnóstico precoz de VIH con prueba rápida. *Revista Española de Salud Pública*. Obtenido de <https://www.scielosp.org/article/resp/2019.v93/e201912119/>
15. Guedes, H. C. (2021). Integralidad en Atención Primaria: análisis del discurso sobre la organización de la oferta de la prueba rápida del VIH. *Escola Anna Nery*. doi:<https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2019-0386>
16. Jaramillo, M. E. (2021). La atención de pacientes con VIH-SIDA en el hospital Divina Providencia de Esmeraldas. Dilemas contemporáneos: educación, política y valores. doi:<https://doi.org/10.46377/dilemas.v8i.2743>
17. Jesús, G. J. (2020). Construcción y validación de material educativo para la promoción de la salud de las personas con VIH. *Revista Latino Americana de Enfermagem*. doi:[10.1590/1518-8345.3748.3322](https://doi.org/10.1590/1518-8345.3748.3322)

18. López, C. (2023). Modelo para capacitar sobre percepción de riesgo en VIH/sida a jóvenes del municipio Manicaragua. EDUMECENTRO. Obtenido de [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_abstract&pid=S2077-28742023000100100&lng=es&nrm=iso](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2077-28742023000100100&lng=es&nrm=iso)
19. Marín, M. (2020). Conocimiento sobre transmisión del virus de inmunodeficiencia humana en adolescentes de educación pública y privada. Archivos Venezolanos de Puericultura y Pediatría. Obtenido de [https://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S0004-06492020000300078&script=sci\\_abstract](https://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S0004-06492020000300078&script=sci_abstract)
20. Mazo, J. S. (2019). Factores psicosociales asociados a la realización de la prueba diagnóstica del VIH en estudiantes universitarios colombianos. Obtenido de <http://www.scielo.org.co/pdf/acp/v23n1/0123-9155-acp-23-01-158.pdf>
21. Melo, L. D. (2022). Prevención de infecciones de transmisión sexual entre los jóvenes e importancia de la educación sanitaria. Enfermería Global. doi:<https://dx.doi.org/10.6018/eglobal.481541>
22. Miró. (2021). Detección de pacientes con infección desconocida por VIH en los servicios de urgencias españoles: actitud actual y predisposición y dificultades percibidas para implementar acciones de mejora. Revista Científica de la sociedad española de medicina de urgencias y emergencias. Obtenido de <https://revistaemergencias.org/numeros-antteriores/volumen-33/numero-4/deteccion-de-pacientes-con-infeccion-desconocida-por-vih-en-los-servicios-de-urgencias-espanoles-actitud-actual-y-predisposicion-y-dificultades-percibidas-para-implementar-acciones-de-m>
23. MSP. (2019). salud.gob.ec. Obtenido de [https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2020/11/gaceta\\_vih\\_2019-1.pdf](https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2020/11/gaceta_vih_2019-1.pdf)
24. Oblitas, F. Y. (2020). Validación de Guía de Consejería para adherencia al tratamiento. Revista Latino Americana de Enfermagem. doi:10.1590/1518-8345.3117.3228
25. OMS. (2023). Obtenido de <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids>
26. Ortés, J. V. (2020). Salud Pública y erradicación de la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana. Revista Española de Salud Pública. Obtenido de [https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1135-57272019000100008](https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272019000100008)



27. Parra, S. d. (2018). Percepción de enfermería respecto a la atención hospitalaria otorgada a personas que viven con VIH. *Enfermería: Cuidados Humanizados*. doi:<https://doi.org/10.22235/ech.v7i2.1643>
28. Velásquez, M. R. (2020). PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A EPIDEMIA DEL VIH/SIDA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN PUNTA ARENAS. *Texto & Contexto - Enfermagem*. doi:<https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2019-0350>
29. Ventura, C. (2021). Significado de cuidado en las relaciones de personas que viven con VIH/SIDA. *Universidad y Salud*. doi:<https://doi.org/10.22267/rus.212303.236>

© 2024 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).