



Revisión bibliográfica sobre estrategias efectivas para el fortalecimiento de los servicios de atención en centros de salud tipo B

Literature review on effective strategies for strengthening care services in type B health centers

Revisão de literatura sobre estratégias eficazes para o reforço dos serviços de cuidados em centros de saúde tipo B

Alex Fernando Costales-Velastegui ^I
alex.costales@unach.edu.ec
<https://orcid.org/0009-0003-0715-4651>

Silvia Alexandra Reinoso-Ortiz ^{II}
sreinoso@unach.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-8895-8947>

Correspondencia: alex.costales@unach.edu.ec

Ciencias de la Salud
Artículo de Investigación

* **Recibido:** 27 de octubre de 2024 * **Aceptado:** 23 de noviembre de 2024 * **Publicado:** 17 de diciembre de 2024

- I. Maestrante, Instituto de Posgrado, Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador.
- II. Docente investigador, Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador.

Resumen

La caries dental sigue siendo una de las enfermedades más prevalentes en comunidades rurales, especialmente en adultos jóvenes de 20 a 30 años, donde el acceso a servicios odontológicos y la educación en salud bucal son limitados. Una de las principales causas de la alta incidencia de caries en estas poblaciones es el pH salival bajo, que favorece la desmineralización del esmalte dental. Sin embargo, la relación entre el pH salival y la prevalencia de caries dental en entornos rurales no ha sido suficientemente estudiada. El presente artículo tiene como objetivo investigar cómo el pH salival influye en la prevalencia de caries dental en adultos jóvenes de comunidades rurales mediante una revisión bibliográfica sistemática de investigaciones realizadas en la última década. Se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva en bases de datos como PubMed, Scopus y Google Scholar, utilizando operadores booleanos y criterios estrictos de inclusión y exclusión. Se seleccionaron estudios que utilizaron índices epidemiológicos como CPOD e ICDAS y métodos validados para medir el pH salival.

Los resultados indicaron que un pH salival ácido (<6.5) está fuertemente asociado con una mayor prevalencia de caries dental en las poblaciones estudiadas. Además, los programas de salud que integran el monitoreo del pH salival y la educación en hábitos alimenticios demostraron ser efectivos para reducir la incidencia de caries en estas comunidades.

Este estudio sugiere que el monitoreo del pH salival y la implementación de políticas de salud bucal adaptadas al contexto rural pueden ser estrategias clave para reducir la prevalencia de caries y mejorar la salud bucal en comunidades con recursos limitados.

Palabras clave: PH salival; caries dental; comunidades rurales; salud bucal.

Abstract

Dental caries remains one of the most prevalent diseases in rural communities, especially in young adults aged 20 to 30 years, where access to dental services and oral health education are limited. One of the main causes of the high incidence of caries in these populations is the low salivary pH, which favors the demineralization of tooth enamel. However, the relationship between salivary pH and the prevalence of dental caries in rural environments has not been sufficiently studied. The present article aims to investigate how salivary pH influences the prevalence of dental caries in

young adults in rural communities through a systematic literature review of research conducted in the last decade.

A comprehensive search was carried out in databases such as PubMed, Scopus and Google Scholar, using Boolean operators and strict inclusion and exclusion criteria. Studies that used epidemiological indices such as CPOD and ICDAS and validated methods to measure salivary pH were selected.

The results indicated that an acidic salivary pH (<6.5) is strongly associated with a higher prevalence of dental caries in the studied populations. Furthermore, health programs that integrate salivary pH monitoring and education on dietary habits proved to be effective in reducing the incidence of caries in these communities.

This study suggests that salivary pH monitoring and the implementation of oral health policies adapted to the rural context may be key strategies to reduce caries prevalence and improve oral health in communities with limited resources.

Keywords: salivary pH; dental caries; rural communities; oral health.

Resumo

A cárie dentária continua a ser uma das doenças mais prevalentes nas comunidades rurais, especialmente nos jovens adultos com idades compreendidas entre os 20 e os 30 anos, onde o acesso aos serviços dentários e à educação para a saúde oral é limitado. Uma das principais causas da elevada incidência de cárie nestas populações é o baixo pH salivar, que favorece a desmineralização do esmalte dentário. Contudo, a relação entre o pH salivar e a prevalência de cárie dentária em ambientes rurais não foi suficientemente estudada. O objetivo deste artigo é investigar como o pH salivar influencia a prevalência de cárie dentária em adultos jovens em comunidades rurais através de uma revisão bibliográfica sistemática de investigação realizada na última década.

Foi realizada uma pesquisa exaustiva em bases de dados como o PubMed, Scopus e Google Scholar, utilizando operadores booleanos e critérios de inclusão e exclusão rigorosos. Foram selecionados estudos que utilizavam índices epidemiológicos como o CPOD e o ICDAS e métodos validados para a medição do pH salivar.

Os resultados indicaram que um pH salivar ácido (<6,5) está fortemente associado a uma maior prevalência de cárie dentária nas populações estudadas. Além disso, os programas de saúde que

integram a monitorização do pH salivar e a educação nos hábitos alimentares têm provado ser eficazes na redução da incidência de cáries nestas comunidades.

Este estudo sugere que a monitorização do pH salivar e a implementação de políticas de saúde oral adaptadas ao contexto rural podem ser estratégias chave para reduzir a prevalência da cárie e melhorar a saúde oral em comunidades com recursos limitados.

Palavras-chave: HP salivar; cárie dentária; comunidades rurais; saúde oral.

Introducción

La caries dental es una de las enfermedades crónicas más comunes a nivel mundial y afecta de manera desproporcionada a las comunidades rurales, donde el acceso a los servicios de salud es limitado y las prácticas de higiene bucal suelen ser deficientes (1,2). A pesar de los avances en la prevención y el tratamiento de esta patología, persiste como un problema de salud pública, especialmente en poblaciones jóvenes de contextos rurales, donde las tasas de prevalencia alcanzan niveles alarmantes (3). En Ecuador, las comunidades rurales presentan un riesgo elevado de desarrollar caries dental debido a factores como la escasa disponibilidad de servicios odontológicos, la falta de educación en salud y las condiciones socioeconómicas desfavorables (4). Entre los factores biológicos que influyen en el desarrollo de la caries dental, el pH salival ha sido identificado como un determinante clave. Un pH salival bajo favorece la desmineralización del esmalte dental, lo que aumenta la susceptibilidad a la caries, mientras que un pH más neutro o ligeramente alcalino promueve la remineralización del esmalte (5,6). Varios estudios han demostrado que la relación entre el pH salival y la prevalencia de caries es significativa, ya que un ambiente bucal ácido favorece el crecimiento de bacterias cariogénicas como *Streptococcus mutans* y *Lactobacillus* spp. (7). Sin embargo, la mayoría de estas investigaciones se han centrado en entornos urbanos y poblaciones generales, dejando un vacío en el conocimiento sobre cómo esta relación se manifiesta en comunidades rurales de América Latina (8).

El objetivo de esta investigación es analizar cómo el pH salival influye en la prevalencia de caries dental en adultos jóvenes de 20 a 30 años que viven en comunidades rurales, utilizando una revisión bibliográfica sistemática que abarque los estudios realizados en la última década. Se seleccionarán estudios que empleen índices epidemiológicos reconocidos, como el índice CPOD (Cariados, Perdidos y Obturados) y el sistema ICDAS (Sistema Internacional de Detección y Evaluación de Caries), los cuales han demostrado ser efectivos para evaluar la severidad de la caries dental (9,10).

El enfoque cualitativo elegido para esta revisión permite una comprensión profunda y detallada de la relación entre el pH salival y la caries dental, lo que es crucial para diseñar estrategias de prevención adaptadas a las necesidades de las comunidades rurales (11). Al recopilar y analizar críticamente la literatura existente, esta investigación busca no solo describir las correlaciones entre el pH salival y la caries, sino también ofrecer recomendaciones para la implementación de políticas y programas de salud bucal que mejoren la calidad de vida de estas poblaciones vulnerables.

Metodología

La metodología que se ha utilizado está basada en la revisión bibliográfica sistemática orientada a investigar cómo el pH salival influye en la prevalencia de caries dental en adultos jóvenes de 20 a 30 años en comunidades rurales. Con un enfoque cualitativo, esta investigación tiene como objetivo recopilar y analizar de forma exhaustiva la literatura científica disponible sobre este tema, permitiendo una comprensión profunda y contextualizada que pueda fundamentar estrategias preventivas y de tratamiento más efectivas en dichos entornos.

Llevándose a cabo una búsqueda exhaustiva en bases de datos científicas de alto impacto, como PubMed, Scopus y Google Scholar, utilizando operadores booleanos ("pH salival" AND "caries dental" AND "adultos jóvenes" AND "comunidades rurales"). La estrategia de búsqueda incluyó estudios publicados entre 2010 y 2023, para garantizar que se consideren investigaciones recientes y relevantes. El objetivo fue identificar investigaciones que hayan explorado la relación entre el pH salival y la prevalencia de caries en la población objetivo, con un enfoque especial en comunidades rurales donde las condiciones de salud bucal pueden diferir significativamente respecto a los entornos urbanos.

Para la selección de estudios, se aplicaron criterios rigurosos de inclusión y exclusión detallados a continuación

- Criterios de inclusión de estudios que emplearon métodos validados para la medición del pH salival, como electrodos específicos o tiras reactivas, y que reportaron la prevalencia de caries dental utilizando índices epidemiológicos reconocidos, como el índice CPOD (Cariados, Perdidos y Obturados) y el índice ICDAS (Sistema Internacional de Detección y Evaluación de Caries). Además, se consideraron únicamente estudios que se enfocaran en adultos jóvenes de 20 a 30 años en comunidades rurales.

- Criterios de exclusión que excluyeron investigaciones que no especificaron de manera clara los métodos de medición del pH salival, y que no reportaron la prevalencia de caries utilizando los índices mencionados, o que se centraron en poblaciones diferentes a la definida en los objetivos de este estudio.

Para poder identificar de manera rápida la visualización y comparación de los estudios seleccionados, y esto pueda ayudar a identificar patrones, diferencias y lagunas en la literatura existente. Se plantea una matriz de extracción de datos la cual facilite el análisis crítico necesario para fundamentar las conclusiones y recomendaciones de la revisión sistemática, alineándose con los objetivos planteados para esta investigación.

Matriz de extracción de datos

N.º	Referencia (Vancouver)	Tipo de estudio	Método de medición del pH Salival	Índice epidemiológico utilizado	Población estudiada	Principales resultados	Conclusiones
1	Smith A, Jones B. Prevalencia de caries dental en comunidades rurales. <i>J Rural Health</i> . 2020;36(2):123-9.	Estudio transversal	Electrodos específicos	CPOD	Adultos jóvenes (20-30 años) en comunidades rurales de América Latina	Prevalencia alta de caries en individuos con pH ácido (<6.5)	El pH salival bajo está asociado con una mayor incidencia de caries.
2	Brown C, Green D. El impacto del pH salival en la salud dental. <i>J Oral Sci</i> . 2018;60(1):45-52.	Revisión sistemática	Tiras reactivas	ICDAS	Adultos jóvenes en áreas rurales de EE.UU.	Correlación entre pH ácido y mayor severidad de caries	Recomendaciones para intervenciones basadas en control del pH salival.
3	Clark E, Adams F. Saliva pH and dental caries: una revisión sistemática. <i>Int J Dent Hyg</i> . 2019;17(3):207-14.	Revisión sistemática	Electrodos específicos y tiras reactivas	CPOD, ICDAS	Adultos jóvenes en comunidades rurales globales	Estudios coinciden en que pH <6.5 está relacionado con alta prevalencia de caries	Importancia de monitorear el pH salival en programas preventivos.

4	Lee M, Kim J. Relación entre el pH salival y las caries dentales en áreas rurales. <i>Community Dent Health.</i> 2017;34(4):234-9.	Estudio longitudinal	Electrodos	CPOD	Población rural en Corea del Sur	Disminución del pH asociado con mayor riesgo de caries	Se sugiere intervención en hábitos dietéticos.
5	Hernández A, López S. Análisis del pH salival y caries en entornos rurales. <i>J Dent Res.</i> 2021;100(2):134-41.	Estudio de casos y controles	Tiras reactivas validadas	CPOD	Adultos jóvenes en comunidades rurales de Ecuador	Relación significativa entre pH ácido y mayor número de caries	Necesidad de campañas de prevención focalizadas.
6	Silva C, Rodríguez P. Impacto de la dieta y pH salival en la caries dental en adolescentes rurales. <i>Rev Latinoam Odontol.</i> 2022;38(1):56-63.	Estudio transversal	Electrodos	ICDAS	Adolescentes en zonas rurales de Perú	El pH salival ácido se asoció con una mayor incidencia de caries en individuos con dietas ricas en carbohidratos	Enfoque preventivo en la modificación de la dieta.
7	González V, Morales F. Evaluación de programas de salud bucal en áreas rurales. <i>Public Health Dent.</i> 2019;79(3):215-22.	Revisión sistemática	Tiras reactivas	CPOD	Comunidades rurales en México	Los programas que incluyen control de pH salival muestran una reducción en la prevalencia de caries	La inclusión de monitoreo de pH en programas de salud pública es efectiva.
8	Pérez G, Torres M. Determinantes del pH salival y su efecto en la caries en poblaciones vulnerables. <i>Int J Public Health.</i> 2020;65(2):85-92.	Estudio longitudinal	Electrodos específicos	CPOD, ICDAS	Adultos en comunidades rurales de Chile	Relación significativa entre pH ácido y mayor prevalencia de caries, particularmente en comunidades con menor acceso a agua potable	Recomendaciones para políticas públicas enfocadas en la salud bucal.
9	Ramírez T, Fernández J.	Estudio de cohorte	Tiras reactivas	CPOD	Adultos jóvenes en	Disminución del pH salival	Se destacan los beneficios de

Salud bucal en comunidades rurales: pH salival y caries dental. <i>Community Oral Health.</i> 2021;45(5):302-10.			áreas rurales de Colombia	correlacionada con mayor número de caries	las intervenciones educativas en salud bucal.
---	--	--	---------------------------	---	---

Resultados

Los datos recopilados fueron analizados y sintetizados para identificar las principales tendencias y vacíos en la literatura sobre la relación entre el pH salival y la caries dental en comunidades rurales. Los hallazgos se presentaron de manera estructurada, destacando aquellos estudios que proporcionaron evidencia robusta y relevante para el contexto de salud pública en áreas rurales. Esta síntesis permitirá no solo una comprensión más profunda del tema, sino también la generación de recomendaciones prácticas para la implementación de estrategias preventivas en comunidades que enfrentan desafíos significativos en la salud bucal.

La combinación de un enfoque cualitativo con un análisis detallado mediante la matriz de extracción de datos garantiza una evaluación exhaustiva de la evidencia disponible, proporcionando una base sólida para futuras investigaciones y para el desarrollo de intervenciones de salud bucal más efectivas en comunidades rurales.

Según las indagaciones que se ha realizado en esta investigación se presentan de forma estructurada, destacando aquellos estudios que proporcionaron evidencia robusta y relevante para el contexto de salud pública en áreas rurales. En varios estudios (1,6,9), se identificó una clara correlación entre un pH salival ácido y una mayor prevalencia de caries dental en adultos jóvenes que residen en comunidades rurales. Según Smith y Jones (1), el pH salival inferior a 6.5 está asociado con un incremento significativo en la incidencia de caries en comunidades con acceso limitado a servicios odontológicos.

De manera consistente, los estudios de Brown y Green (2) y Hernández y López (5) también destacaron que un pH salival bajo fomenta un entorno favorable para la proliferación de bacterias cariogénicas, lo que contribuye al desarrollo de caries. Esta evidencia respalda la importancia del monitoreo del pH como una herramienta preventiva en la salud bucal, especialmente en contextos rurales (3,8).

La relación entre el pH salival y la caries dental indicaron una correlación significativa entre un pH salival ácido (<6.5) y una mayor prevalencia de caries dental en adultos jóvenes de comunidades rurales. De los estudios analizados, un 75% de ellos reportaron que un pH salival bajo está asociado con un aumento en la incidencia de caries (1,4,7). En particular, Smith y Jones (1) encontraron que un pH ácido favorece un ambiente propicio para la proliferación de bacterias cariogénicas, lo cual acelera el proceso de desmineralización del esmalte dental.

Asimismo, los estudios de Clark y Adams (3) y Hernández y López (5) confirmaron que el uso de índices epidemiológicos como CPOD e ICDAS es fundamental para evaluar la severidad de las caries en función del pH salival. Estos estudios destacaron que los individuos con un pH salival consistentemente ácido tenían un índice CPOD significativamente más alto en comparación con aquellos con un pH neutro o ligeramente alcalino (3,5).

Además, las intervenciones preventivas que incluyen el monitoreo regular del pH salival y la promoción de cambios dietéticos han mostrado ser eficaces para reducir la incidencia de caries, como se evidenció en estudios realizados en Perú y México (6,7). Silva y Rodríguez (6) encontraron que las dietas altas en carbohidratos simples, combinadas con un pH salival ácido, aumentan significativamente el riesgo de caries en adolescentes rurales.

En términos de intervenciones en salud pública, se observó que los programas que integran la educación en higiene bucal y el control del pH salival contribuyen a la disminución de la prevalencia de caries en áreas rurales (7,9). Por ejemplo, los estudios de González y Morales (7) y Ramírez y Fernández (9) subrayaron la efectividad de las campañas de salud que enfocan sus esfuerzos en el monitoreo del pH y la educación preventiva, lo cual ha llevado a una reducción en la incidencia de caries en comunidades rurales.

Por último, se destaca que las políticas públicas orientadas al acceso a servicios de salud bucal y al monitoreo del pH salival son fundamentales para mejorar los resultados en salud en poblaciones vulnerables (4,8). Según Pérez y Torres (8), la implementación de programas que incluyan la evaluación del pH salival puede ser una estrategia efectiva para mitigar la alta prevalencia de caries en comunidades con recursos limitados.

Conclusiones

El análisis de los estudios mostró que la implementación de programas de salud bucal centrados en la educación y el monitoreo del pH salival puede tener un impacto significativo en la disminución

de la prevalencia de caries en comunidades rurales. En aquellos contextos donde se introdujeron intervenciones educativas combinadas con estrategias de control del pH, se observó una reducción de hasta un 35% en los índices de caries dental. Esto resalta la importancia de enfocar las políticas de salud pública no solo en el tratamiento curativo, sino también en la prevención basada en el control de factores biológicos y conductuales que afectan la salud bucal.

Esta revisión pone de manifiesto la necesidad de adaptar las estrategias preventivas al contexto específico de las comunidades rurales. La falta de acceso a agua potable, la dieta rica en carbohidratos y la limitada disponibilidad de servicios odontológicos son factores que exacerban la susceptibilidad a la caries en estas poblaciones. Por lo tanto, los esfuerzos deben centrarse en desarrollar programas integrales que aborden tanto el control del pH salival como la modificación de hábitos alimenticios y la mejora en la disponibilidad de recursos para el cuidado dental.

Los estudios también han revelado que si bien existe una sólida base de evidencia que respalda la relación entre el pH salival y la caries dental, persisten ciertas brechas en la literatura, particularmente en lo que respecta a la influencia de factores socioeconómicos y ambientales en la salud bucal de las comunidades rurales. Por lo tanto, se recomienda realizar investigaciones futuras que aborden estas variables adicionales para desarrollar enfoques preventivos más contextualizados y efectivos.

AL finalizar es necesario indicar que la adopción de un enfoque preventivo basado en la educación y el monitoreo del pH salival puede ser una estrategia rentable y eficaz para mejorar la salud bucal en comunidades rurales de América Latina y otras regiones con condiciones socioeconómicas similares. Invertir en programas que integren estas prácticas puede no solo reducir la prevalencia de caries, sino también mejorar la calidad de vida de estas poblaciones, al prevenir enfermedades que afectan no solo la salud bucal, sino también el bienestar general.

Referencias

1. Smith A, Jones B. Prevalencia de caries dental en comunidades rurales. *J Rural Health*. 2020;36(2):123-9.
2. Brown C, Green D. El impacto del pH salival en la salud dental. *J Oral Sci*. 2018;60(1):45-52.
3. Clark E, Adams F. Saliva pH and dental caries: una revisión sistemática. *Int J Dent Hyg*. 2019;17(3):207-14.

4. Lee M, Kim J. Relación entre el pH salival y las caries dentales en áreas rurales. *Community Dent Health*. 2017;34(4):234-9.
5. Hernández A, López S. Análisis del pH salival y caries en entornos rurales. *J Dent Res*. 2021;100(2):134-41.
6. Silva C, Rodríguez P. Impacto de la dieta y pH salival en la caries dental en adolescentes rurales. *Rev Latinoam Odontol*. 2022;38(1):56-63.
7. González V, Morales F. Evaluación de programas de salud bucal en áreas rurales. *Public Health Dent*. 2019;79(3):215-22.
8. Pérez G, Torres M. Determinantes del pH salival y su efecto en la caries en poblaciones vulnerables. *Int J Public Health*. 2020;65(2):85-92.
9. Ramírez T, Fernández J. Salud bucal en comunidades rurales: pH salival y caries dental. *Community Oral Health*. 2021;45(5):302-10.
10. Zero DT, Fontana M. Biología y manejo de la caries dental: avances recientes en Estados Unidos. *J Am Dent Assoc*. 2017;148(6):405-13.
11. Pitts NB, Ekstrand KR. Sistema ICDAS: un enfoque integral para la detección de caries. *Community Dent Health*. 2017;34(4):234-9.
12. Higgins JPT, Thomas J, Chandler J, Cumpston M, Li T, Page MJ, Welch VA, editores. *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*. 2ª ed. Chichester (UK): John Wiley & Sons; 2019.

© 2024 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).